

Guía del procedimiento: Enema en niños

Características especiales

Observar intolerancia a la manzanilla

Material

- Utensilio para enema de goma, según la edad del niño (hay 3 tamaños disponibles en la farmacia)
- Para niños mayores, un irrigador con sistema de manguera
- O una jeringa de vejiga con un catéter hembra de tamaño 12 CH
- Agua tibia
- O
- Té de manzanilla ligero y tibio, recién preparado (aprox. 35-37 ° C) (cantidad de líquido según la edad: 50-150 ml), a la que se agrega una pizca de sal de mesa pura (equivalente aproximadamente a una solución fisiológica de sal de mesa)
- Vaselina para hacer que el utensilio sea resbaladizo
- Protección de la cama y papel de celulosa / o de cocina.
- Material para pañales o incontinencia
- Manta para cubrir al niño

Implementación de la aplicación

- Preparar el Material de protección para la cama y por la incontinencia
- Llenar el utensilio de goma para el enema / irrigador
- Lubricar el accesorio
- El niño se acuesta sobre el lado izquierdo del cuerpo, con las piernas dobladas.
- Deje que el líquido corra hacia la punta del catéter. (la manguera está sin aire)
- La punta del catéter o la punta del globo se introduce suavemente en el ano.
- Deje que el líquido ingrese lentamente al intestino. (para los irrigadores: regular la velocidad de entrada por medio de la altura del irrigador)
- Retire el catéter pinzándolo, apretándolo, y tome la punta con la toalla de papel.
- Envuelva al niño, cúbralo de manera cómoda y cálida.
- Observe la condición del niño y permanezca junto al él.
- Una repetición es posible después de 1 a 2 horas.

Seguimiento

- Limpiar muy bien el utensilio de goma para el enema / irrigador
- Descartar el Material desechable

Evidencia

Probado exitosamente con muchos pacientes.

Dosificación

1-3 x día

Inicio del efecto

Inmediatamente

Duración del tratamiento

Hasta que el niño vuelva a beber por sí mismo dentro de un día

Advertencia

Si el niño no bebe por más de 1 día, ¡se requiere urgentemente una consulta médica!